



โรคฉวยโรคปอด

รักษาได้ไม่แพร่กระจาย



สาเหตุ

- ★ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- ★ ผู้ป่วยไอ จาม อยู่ใกล้หายใจรับเชื้อ



การวินิจฉัย

- ★ ตรวจหาเสมหะหาเชื้อ และเอกซเรย์ปอด



อาการ

- ★ น้ำหนักลด
- ★ เบื่ออาหาร
- ★ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์
- ★ ไอมีเสมหะปนเลือด
- ★ เหนื่อยออกมากตอนกลางคืน
- ★ มีไข้ต่ำๆ ตอนบ่ายหรือเย็น เรื้อรัง



การรักษา

- ★ รักษาหายขาดได้ด้วยยา
- ★ กินยาให้ครบทุกมื้อ ทุกเม็ด ตามแพทย์สั่ง

โรคฉับโรคปอด

รักษาได้ไม่แพร่กระจาย

การป้องกัน



- ★ เสี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
- ★ ตรวจเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ★ หากสงสัยว่าจะเป็นวัณโรคให้รีบพบแพทย์
- ★ สวมหน้ากากอนามัยหากต้องเข้าไปในชุมชนที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท
กรณีมีผู้ป่วยวัณโรคอาศัยอยู่ร่วมกัน
- ★ หากต้องดูแลผู้ป่วยวัณโรคผู้ดูแลต้องสวมที่ปิดจมูก N95
- ★ ผู้ป่วยวัณโรคต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัว และชุมชน
- ★ ทั้งผู้ป่วยวัณโรค และผู้ดูแลต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

“รู้เร็ว รักษาหาย ไม่กระจายเชื้อ”